

Folaga
Fulica atra
Linnaeus, 1758

Classe: *Aves* - **Ordine:** *Gruiformes* - **Famiglia:** *Rallidae*

Distribuzione: Eurasia, Africa settentrionale e Oceania, in Sardegna è specie migratrice parziale. Nidifica su tutte le zone umide costiere, tra le canne e la vegetazione acquatica; molto diffusa in Sardegna.

Descrizione: corpo arrotondato, piumaggio interamente nero, solo il becco appuntito e la placca frontale sono bianchi. Occhi marroni nei giovani, rossi negli adulti, le remiganti secondarie sono bordate di bianco e le zampe sono di colore verdastro. Non hanno zampe palmate come le anatre. Non presentano dimorfismo sessuale.

Biologia/Habitat: vive negli stagni, nei laghi e nella baie poco profonde, con vegetazione densa, negli spazi d'acqua dolce e salmastra. D'inverno si sposta verso i corpi d'acqua più grandi. Predilige ambienti di acqua bassa accanto a punti profondi fino a più di 2 metri e con vegetazione a mosaico e presenza di isolotti; nidifica anche in aree artificiali quali canali di irrigazione e invasi derivanti da attività di cava.

Alimentazione: si nutre di sostanze vegetali di insetti, di molluschi, di uova di pesci e crostacei.

Riproduzione: la nidificazione avviene tra marzo e aprile. Durante il periodo riproduttivo occupa zone umide anche di ridotte dimensioni, purché caratterizzate dalla presenza di acque ferme o a debole corso. La coppia costruisce il nido tra la vegetazione di riva dove la femmina depone 3-12 uova che vengono covate per 21-23 giorni. I piccoli rimangono nel nido per 55-60 giorni .

Fattori di minaccia: bonifica, inquinamento delle acque, caccia incontrollata.

Status: è inserita negli All. II-A e III-B della Direttiva "Uccelli Selvatici" 79/409/CEE e nell'All. III della Convenzione di Berna. Considerata a rischio minimo (LC) dalla IUCN. E' inclusa tra le specie cacciabili dalla L.R. 29 luglio 1998, n°23 della R.A.S.

testi tratti da:

Piano di Gestione del SIC

