

Lucertola campestre
Podarcis siculus
Rafinesque, 1810

Classe: *Reptilia* - **Ordine:** *Squamata*- **Famiglia:** *Lacertidae*

Distribuzione: Italia, Corsica, Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia.

Descrizione: lucertola molto variabile, lunga da 15 a 25 cm (coda compresa) con testa piuttosto grossa e corpo robusto. Parti inferiori di solito biancastre o con sfumature verdastre, quasi sempre senza punteggiatura scura. Tipicamente verde, giallastra, verde oliva o marrone chiara superiormente. Le femmine tendono a essere piccole, con testa più piccola dei maschi e hanno un disegno caratteristico a strisce più evidente.

Biologia/Habitat: si trova principalmente nelle zone erbose, ai margini delle strade. In altre aree si trova anche in campi molto aperti e in aree piane abbandonate, zone sabbiose vicino al mare, vigne; è in grado di percorrere lunghe distanze per trovare riparo. Caccia sul terreno, ma torna sui muri a secco o tra i cespugli per rifugiarsi; riesce ad arrampicarsi molto abilmente e, in caso di assenza di specie meglio adattate, può occupare altri habitat, come quelli rocciosi con poca vegetazione o anche ruderi. Tollera meglio di altre lucertole la vicinanza dell'uomo.

Alimentazione: sono principalmente insettivori.

Riproduzione: primaverile.

Fattori di minaccia: nessuno; comune e diffusa in gran parte del territorio, è ritenuta in espansione a scapito delle altre specie presenti.

Status: inserita nell'All. IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. È considerata specie a rischio minimo (LC) dall'IUCN.

testi tratti da:

Piano di Gestione del SIC

